



RAPPORT DE LA HUITIEME REUNION DU GROUPE CONSULTATIF DU PROGRAMME OMS  
DE PREVENTION DE LA CECITE

Baltimore, 14-17 mars 1989

INTRODUCTION

La huitième réunion du Groupe consultatif du Programme OMS de Prévention de la Cécité s'est tenue du 14 au 17 mars 1989 au Dana Center, International Center for Epidemiologic and Preventive Ophthalmology, Wilmer Institute, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Etats-Unis d'Amérique. Le Groupe avait été invité à tenir sa réunion en ces lieux à l'occasion du centenaire de la fondation des Johns Hopkins Medical Institutions.

Onze des 12 membres du Groupe consultatif, un représentant de la Banque mondiale et plusieurs chefs d'organisations non gouvernementales internationales collaborant avec le Programme OMS de Prévention de la Cécité ont participé à la réunion. Le secrétariat comprenait des conseillers régionaux de cinq Bureaux régionaux de l'OMS, ainsi que du personnel du Programme au Siège. La liste des participants est jointe en Annexe 1.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion, le Dr A. Patz, Directeur du Wilmer Institute, le Dr D. A. Henderson, Doyen de l'Ecole de Santé publique, et le Dr R. A. Ross, Doyen de l'Ecole de Médecine, ont prononcé des allocutions.

Le Professeur A. Sommer, de l'institution hôte, a été invité à l'unanimité à assumer la Présidence de la réunion, et le Dr S. Basurto de Garcia a été nommée Vice-Président. Le Dr H. Faal a exercé les fonctions de Rapporteur. L'ordre du jour a été adopté sans modification. Le texte en est reproduit dans l'Annexe 2.

1. EXAMEN DES ACTIVITES AU NIVEAU MONDIAL

1.1 Aperçu général

D'une manière générale, le Programme OMS de Prévention de la Cécité (PBL) a continué à étendre ses activités au cours de la période biennale 1987-1988. L'objectif défini dans le Septième Programme général de Travail de l'OMS, à savoir qu'au moins 60 pays en développement devraient être dotés de programmes nationaux de prévention de la cécité d'ici 1989, sera atteint comme prévu. Selon les informations disponibles ces programmes se répartissent comme suit :

- Région africaine	: 16 pays
- Région des Amériques	: 15 pays
- Région de la Méditerranée orientale	: 9 pays
- Région européenne	: 3 pays
- Région de l'Asie du Sud-Est	: 10 pays
- Région du Pacifique occidental	: 9 pays
Total	: 62 pays

This document is not a formal publication of the World Health Organization (WHO), and all rights are reserved by the Organization. The document may, however, be freely reviewed, abstracted, reproduced and translated, in part or in whole, but not for sale nor for use in conjunction with commercial purposes.

The views expressed in documents by named authors are solely the responsibility of those authors.

Ce document n'est pas une publication officielle de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et tous les droits y afférents sont réservés par l'Organisation. S'il peut être commenté, résumé, reproduit ou traduit, partiellement ou en totalité, il ne saurait cependant l'être pour la vente ou à des fins commerciales.

Les opinions exprimées dans les documents par des auteurs cités nommément n'engagent que lesdits auteurs.