



WORLD HEALTH ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ



SE/CAC/77.8A  
FRANCAIS SEULEMENT  
INDEXE

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CERTIFICATION  
DE L'ERADICATION DE LA VARIOLE EN AFRIQUE CENTRALE

RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LE TERRAIN - TCHAD

Population : 4 121 600

Suivant les recommandations du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, l'enquête sur le terrain a été réalisée du 10 novembre 1976 au 18 janvier 1977.

Sur un total de 250 localités choisies pour cette enquête, 238 ont été visitées par les équipes de surveillance et par le personnel du niveau national. (Voir plan des opérations d'enquête sur le terrain, Dr DELAS ICP/ESD/OO5 AFR/SMALLPOX 7/76-Sélection définitive.)

Dans les localités visitées, un total de 315 écoles primaires, 113 formations sanitaires et 110 autres lieux (marchés, groupes de réfugiés, groupements nomades, etc.) ont été visités pour découvrir des enfants porteurs de marques de variole ou des suspects de variole. On a porté une attention toute particulière aux enfants présentant des marques de variole ou aux suspects de variole survenus depuis 1972.

Un résumé des activités et des résultats de l'enquête sur le terrain est présenté aux sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent rapport.

Les formulaires originaux mentionnés ci-après, qui sont remplis par les équipes de surveillance durant l'enquête, sont conservés au centre d'enquête dans le pays pour examen par les membres de la Commission internationale.

Formule 1 : Itinéraires de visites sur le terrain des équipes nationales d'évaluation.

Formule 2 : Enquêtes sur les cicatrices faciales des enfants des écoles primaires.

Formule 3 : Enquêtes sur les cas suspects ou sur les cicatrices faciales dans des unités sanitaires et autres lieux.

Formule 4 : Enquêtes sur les enfants présentant des cicatrices faciales de variole.

En conclusion, l'enquête n'a pu découvrir aucun foyer résiduel de variole survenue depuis 1972 dans le pays.

The issue of this document does not constitute formal publication. It should not be reviewed, abstracted or quoted without the agreement of the World Health Organization. Authors alone are responsible for views expressed in signed articles.

Ce document ne constitue pas une publication. Il ne doit faire l'objet d'aucun compte rendu ou résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions exprimées dans les articles signés n'engagent que leurs auteurs.

Section 1. Section des localités pour l'enquête sur le terrain

Selon les renseignements démographiques disponibles (1976), il y a au total 15 395 localités dans le pays.

## NOMBRE TOTAL DE LOCALITES CLASSEES PAR IMPORTANCE DE POPULATION POUR L'ENSEMBLE DU PAYS

Population des localités	Nombre de localités	Population totale des localités
Plus de 10 000	13	485 000
8000 à 9999	4	34 600
6000 à 7999	3	23 100
4000 à 5999	15	76 100
2000 à 3999	64	173 000
1000 à 1999	173	252 800
Moins de 1000	15 123	3 077 000
Total	15 395	4 121 600

Sur ce total, un nombre de 250 localités a été choisi pour l'enquête, en appliquant les méthodes recommandées par l'OMS.

## NOMBRE DE LOCALITES CHOISIES (CLASSEES PAR POPULATION)

Population des localités	Nombre de localités choisies	Population totale des localités choisies
Plus de 10 000	13	485 000
8000 à 9999	4	34 600
6000 à 7999	3	23 100
4000 à 5999	15	76 100
2000 à 3999	64	173 000
1000 à 1999	151	226 400
Moins de 1000		
Total	250 <sup>1</sup>	1 018 200 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pourcentage par rapport au nombre total de localités du pays : 1,6 %.

<sup>2</sup> Pourcentage par rapport à la population totale du pays : 25 %.

Section 2. Equipes de surveillance

Un total de 7 équipes de surveillance a été employé pour l'enquête sous la direction et la supervision du responsable national de l'enquête.

Les régions ont été divisés en plusieurs zones, confiées à un certain nombre d'équipes :

Répartition des zones et nombre d'équipes de surveillance

Répartition des zones pour l'enquête sur le terrain	Nombre d'équipes de surveillance affectées à ces zones
Chari-Bag, Kanem, Lac	1
Mayo-Kébbi	1
Logone occidental	
Logone oriental	
Tandjile	1
Moyen-Chari	1
Ouddaï, Biltine	1
Batha, Guera	1
B.E.T., Salamat	1
Total	7

Chaque équipe de surveillance était composée de :

- 1 agent technicien sanitaire
- 1 infirmier breveté
- 1 manoeuvre
- 1 chauffeur

Pour la supervision et l'évaluation des activités des équipes de surveillance, les mesures suivantes ont été prises :

- Stage de formation pour l'enquête sur le terrain
- Supervision de 10 % des opérations
- Intervention éventuelle en cas de suspicion
- Répartition de moyens logistiques

La supervision a été effectuée par l'Equipe nationale composée du Dr Tirandibaye, du Dr Delas, Chef de Projet ICP et ESD 005 qui se sont rendus par route ou par avion dans un certain nombre de localités pour constater la bonne exécution de l'évaluation.

Section 3. Rapports des équipes de surveillanceVisites des équipes de surveillance dans les écoles primaires,  
les formations sanitaires et les autres endroits

Nombre de localités choisies	Nombre de localités visitées	Ecoles primaires			Nombre de		
		Existantes	Visitées	Nombre d'enfants examinés	Formations sanitaires existantes	Formations sanitaires visitées	Autres* visités
250	238	284 (prévues)	315	130 806	112 (prévues)	113	110

\* Marchés, jardins d'enfants, camps de réfugiés, groupements nomades, etc.

Section 4. Résultats de l'enquête sur les cicatrices faciales de variole

Catégories de personnes	Nombre de personnes examinées	Nombre ayant des cicatrices faciales de variole			Nombre de cas de variole suspectés en 1972 ou après
		Apparues en 1971 ou avant	Apparues en 1972 ou après	Nombre ayant fait l'objet d'une enquête	
Age préscolaire	13 802	-	-	-	-
Ecoles primaires	130 806	78	-	78	-
Age supérieur à celui de la fréquentation des écoles primaires	14 241	1	-	1	-
Total	158 849	79	-	79	-

Section 5. Résultat de l'enquête sur les cas suspects

Nombre d'endroits* visités par les équipes pour détecter des cas suspects de variole	Nombre d'endroits où des cas suspects ont été indiqués	Nombre de cas suspects investigués par les équipes	Nombre de cas de variole suspectés en 1975 ou après
538	0	0	0

\* Hôpitaux, dispensaires, centres de PMI, groupements nomades, camps de réfugiés, fêtes populaires, écoles primaires.

