



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

NOTE POUR LA PRESSE

SITE WEB

www.who.int

1211 GENÈVE 27 SUISSE - TÉLÉPHONE: (41) 22.791.21.11 - FAX: (41) 22.791.31.11 - E-MAIL: inf@who.int

Note pour la presse N°2
27 janvier 2004

LA POLIOMYELITE SE PROPAGE DANS LE CENTRE ET DANS L'OUEST DE L'AFRIQUE

UNE FLAMBEE DUE A UN POLIOVIRUS IMPORTE DU NIGERIA FRAPPE UN SEPTIEME PAYS JUSQUE LA INDEMNIE, LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Genève – Un cas de poliomyélite paralytique dû au poliovirus de type 1 vient d'être confirmé. Il est survenu en République centrafricaine à quelque 200 km au nord de Bangui ; la paralysie est apparue le 16 décembre 2003. Le virus détecté s'apparente aux virus qui circulaient en 2003 dans le nord du Nigéria, où les campagnes de vaccination antipoliomyélitique ont pris fin en août 2003.

Aucun cas n'avait été signalé en République centrafricaine depuis juillet 2000. Celui qui vient de se produire fait suite à d'autres cas survenus dans des pays jusque là indemnes en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale après propagation d'un poliovirus de type 1 provenant du nord du Nigéria : le Bénin (1 cas), le Burkina Faso (7 cas), le Cameroun (1 cas), le Ghana (8 cas), le Tchad (5 cas) et le Togo (1 cas).

Le Nigéria doit immédiatement reprendre ses campagnes de vaccination dans le nord du territoire pour renforcer l'immunité de la population, endiguer la poussée épidémique et soustraire à cette menace permanente les enfants de tous les pays d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec Oliver Rosenbauer, Chargé de communication, Initiative pour l'éradication mondiale de la poliomyélite, Organisation mondiale de la Santé, tél. +41 (0)22 791 3832, courriel : rosenbauero@who.int.

Tous les communiqués de presse, aide-mémoire et articles de fond de l'OMS peuvent être obtenus sur Internet à la page d'accueil de l'OMS : <http://www.who.int>