

# Приложение 2:

## Пояснения к Таблице 1

### Источники (по графам)

b,c,d,e,f,g	Отчеты стран о дозорном эпиднадзоре (1997–2002 гг.) и база данных о результатах эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом; Бюро переписи населения США; Центр международных программ; отдел по проведению исследований в области здравоохранения, 2002 г.	k	% молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые знают о том, что здоровый на вид человек может передавать СПИД. В знаменателе указано число респондентов, которые не слышали о СПИДе.
h,i,j,k,l	ЮНИСЕФ. Обследования по методу мультииндикативного кластерного анализа (1999–2001 гг.); обследования в области демографии и здравоохранения, «Макро Интернэшл» (1997–2001 гг.)	l	% молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые правильно дали отрицательный ответ на два вопроса, отражающих наиболее распространенные в их общине неправильные представления о передаче и профилактике СПИДа, и которые знают о том, что здоровый на вид человек может передавать СПИД. В знаменателе указано число респондентов, которые не слышали о СПИДе.
m,n,o,p	Обследования в области демографии и здравоохранения, «Макро Интернэшл» (1998–2001 гг.); обследования по странам.	m	% мужчин (в возрастной группе 15–59 лет), которые за предшествующие 12 месяцев имели половые контакты со случайным партнером (от общего числа респондентов, указавших на то, что у них были половые контакты за последние 12 месяцев).
q, r, t, v	ЮНИСЕФ. Обследования по методу мультииндикативного кластерного анализа, ЮНИСЕФ (1999–2001 гг.); обследования в области демографии и здравоохранения, «Макро Интернэшл» (1997–2001 гг.)	n	% женщин (в возрастной группе 15–49 лет), которые за предшествующие 12 месяцев имели половые контакты со случайным партнером (с партнером вне брака или вне постоянного сожительства) (от общего числа респондентов, указавших на то, что у них были половые контакты за последние 12 месяцев).
s	ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, 2002 г.	o	% мужчин (в возрастной группе 15–59 лет), указавших на то, что они использовали презерватив во время последнего полового контакта со случайным партнером (от общего числа респондентов, указавших на то, что у них были половые контакты с таким партнером за последние 12 месяцев). До 2000 г. в некоторых странах использовалось другое определение. По этой причине данные значения следует рассматривать как показатели уровня риска для соответствующих стран, а не как сравнительные показатели уровня риска между странами.
u	ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, оценочные данные по сиротам, 2001/2002 гг.	p	% женщин (в возрастной группе 15–49 лет), указавших на то, что они использовали презерватив во время последнего полового контакта со случайным партнером (от общего числа респондентов, указавших на то, что у них были половые контакты с таким партнером за последние 12 месяцев). До 2000 г. в некоторых странах использовалось другое определение. По этой причине данные значения следует рассматривать как показатели уровня риска для соответствующих стран, а не как сравнительные показатели уровня риска между странами.

### Пояснения

a	Возрастная группа 14–49 лет		
b	Год сбора данных по результатам дозорного эпиднадзора в основных городских районах (ОГР). [Страны с показателем [n] или [u] – это не медианные, а средние значения, полученные для всех прошедших тестирование женщин, суммированные по всем районам. Средние значения не обязательно являются взвешенными значениями для всех стран.]		
c	% проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 15–19 лет), показавших положительный результат на ВИЧ при проведении стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых женских консультациях в ОГР.		
d	% проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 20–24 лет), показавших положительный результат на ВИЧ при проведении стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых женских консультациях в ОГР.		
e	Год сбора данных по результатам дозорного эпиднадзора в основных городских районах [Страны с показателем [n] или [t] – это не медианные, а средние значения, полученные для всех прошедших тестирование женщин, суммированные по всем районам. Средние значения не обязательно являются взвешенными значениями для всех стран.]		
f	% проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 15–19 лет), показавших положительный результат на ВИЧ при проведении стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых женских консультациях вне ОГР.		
g	% проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 20–24 лет), показавших положительный результат на ВИЧ при проведении стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых женских консультациях вне ОГР.		
h	% молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые слышали о СПИДе.		
i	% молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые, отвечая на вопрос, содержащий несколько ответов, указали, что риск заражения ВИЧ можно снизить, если использовать презерватив. В знаменателе указано число респондентов, которые не слышали о СПИДе.		
j	% молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые, отвечая на вопрос, содержащий несколько ответов, указали, что риск заражения ВИЧ можно снизить, если иметь половые контакты только с одним хранящим верность неинфицированным партнером. В знаменателе указано число респондентов, которые не слышали о СПИДе.		
		q	% женщин (в возрастной группе 15–49 лет), знающих о том, что ВИЧ может передаваться от матери ребенку.
		r	% женщин (в возрастной группе 15–49 лет), которые знают, где можно пройти тестирование на ВИЧ.
		s	Число беременных женщин, инфицированных ВИЧ.
		t	% женщин (в возрастной группе 15–49 лет), которых за период беременности хотя бы один раз осмотрел квалифицированный специалист в области здравоохранения [в группу «квалифицированных специалистов в области здравоохранения» входят только врачей, медсестер и акушеров и НЕ включают людей, применяющих традиционные методы приема родов (обученных или необученных)].
		u	Число детей (в возрастной группе 0–14 лет), чья мать, отец или оба родителя умерли от СПИДа (включая детей, потерявших обоих родителей, а также детей, потерявших одного родителя в результате СПИДа, а другого по иной причине).
		v	Отношение числа детей (в возрастной группе 10–14 лет), потерявших обоих родителей и посещающих школу, к числу детей того же возраста, которые имеют родителей и посещают школу (по результатам обследования, проведенного среди домохозяйств).
		y	Возрастная группа моложе 20 лет
		z	Возрастная группа 15–24 лет
		~	Приблизительно
		[1 и т.д.]	Кол-во участков проведения надзора