

Stări care sunt categoria 1 și 2 pentru toate metodele (metoda poate fi utilizată)		
Vârstă 18-39 ani	Risc crescut de infecție cu HIV	Schistosomiază (bilharzia)
Anemii, inclusiv anemie falciformă și talasemie	Antecedente de diabet gestațional	Intervenții chirurgicale fără imobilizare prelungită
Tumori ovariene benigne, inclusiv chisturi	Antecedente de hipertensiune arterială în timpul sarcinii	Utilizare de antibiotice (cu excepția rifampicinei) sau griseofulvină
Afectiuni ale sânelui: antecedente familiale, afecțiune benignă a sânelui și nodul nedagnosticat	Antecedente de intervenție chirurgicală pelvină, inclusiv operație cezariană	Afecțiuni tiroidiene
Depresie	Menstruație neregulată, abundentă sau prelungită	Tuberculoză (dar, dacă este pelvină, DIU nu poate fi utilizat)
Dismenoree	Malarie	Valvulopatie cardiacă necomplicată
Endometrioză	Sarcină ectopică în antecedente	Vene varicoase
Epilepsie	După avort (fără sepsis)	Hepatită virală (inactivă)

Adnotări la stări

A DIU cu cupru poate fi inserat < 48 ore după naștere sau > 4 săptămâni.
B Dacă nu a avut o sarcină ulterioară, DIU = 2.
C Sau alte forme de cervicită purulentă.
D Dacă această afecțiune apare în timpul utilizării DIU, poate continua să îl utilizeze pe parcursul tratamentului.
E În caz de risc crescut de ITS sau HIV, recomandați utilizarea prezervativelor.
F În cazul unei probabilități foarte mari de expunere la gonoree sau chlamydia = 3.
G Dacă este sub terapie ARV = 2.
H SIDA, dar fără stare clinică bună sub tratament ARV = 3 pentru inserție.
I CDC și fumat > 15 țigări / zi = 4. CIC și fumat ≤ 15 țigări / zi = 2.
J Dacă tensiunea arterială nu poate fi măsurată, și nu are antecedente cunoscute de hipertensiune arterială, pot fi utilizate toate metodele.
K Aceeași categorie se aplică în cazul hipertensiunii controlate adecvat.

L Factorii de risc includ: vârstă mai înaintată, fumat, diabet zaharat, hipertensiune arterială.
M Pentru a verifica dacă migrena este însoțită de aură, întrebați: „Vedeți un punct luminos înainte de a avea dureri puternice de cap?”.
N Migrenă fără aură și vârstă < 35 ani, CDC și CIC = 2. Migrenă fără aură și vârstă ≥ 35 ani, CDC și CIC = 3.
O În caz de diabet zaharat cu complicații, sau diabet cu durată de peste 20 de ani, CDC, CIC, DMPA și NET-EN = 3-4.
P CDC = 3, CIC = 2.
Q Fenitoină, Carbamazepină, Barbiturice, Primidon, Topiramat, Oxcarbazepină.
R Dacă pacienta nu este într-o stare clinică bună, DIU = 3.
S În cazul în care cavitatea uterină este deformată, nu poate utiliza DIU.
T > 45 ani = 2.

Dezvoltat în colaborare cu:



© Organizația Mondială a Sănătății, 2006
© Institutul Est European de Sănătate a Reprodcerii, 2007


Stări care sunt categoria 1 și 2 pentru toate metodele (metoda poate fi utilizată)		
Vârstă 18-39 ani	Risc crescut de infecție cu HIV	Schistosomiază (bilharzia)
Anemii, inclusiv anemie falciformă și talasemie	Antecedente de diabet gestațional	Intervenții chirurgicale fără imobilizare prelungită
Tumori ovariene benigne, inclusiv chisturi	Antecedente de hipertensiune arterială în timpul sarcinii	Utilizare de antibiotice (cu excepția rifampicinei) sau griseofulvină
Afectiuni ale sânelui: antecedente familiale, afecțiune benignă a sânelui și nodul nedagnosticat	Antecedente de intervenție chirurgicală pelvină, inclusiv operație cezariană	Afecțiuni tiroidiene
Depresie	Menstruație neregulată, abundentă sau prelungită	Tuberculoză (dar, dacă este pelvină, DIU nu poate fi utilizat)
Dismenoree	Malarie	Valvulopatie cardiacă necomplicată
Endometrioză	Sarcină ectopică în antecedente	Vene varicoase
Epilepsie	După avort (fără sepsis)	Hepatită virală (inactivă)

Adnotări la stări

A DIU cu cupru poate fi inserat < 48 ore după naștere sau > 4 săptămâni.
B Dacă nu a avut o sarcină ulterioară, DIU = 2.
C Sau alte forme de cervicită purulentă.
D Dacă această afecțiune apare în timpul utilizării DIU, poate continua să îl utilizeze pe parcursul tratamentului.
E În caz de risc crescut de ITS sau HIV, recomandați utilizarea prezervativelor.
F În cazul unei probabilități foarte mari de expunere la gonoree sau chlamydia = 3.
G Dacă este sub terapie ARV = 2.
H SIDA, dar fără stare clinică bună sub tratament ARV = 3 pentru inserție.
I CDC și fumat > 15 țigări / zi = 4. CIC și fumat ≤ 15 țigări / zi = 2.
J Dacă tensiunea arterială nu poate fi măsurată, și nu are antecedente cunoscute de hipertensiune arterială, pot fi utilizate toate metodele.
K Aceeași categorie se aplică în cazul hipertensiunii controlate adecvat.

L Factorii de risc includ: vârstă mai înaintată, fumat, diabet zaharat, hipertensiune arterială.
M Pentru a verifica dacă migrena este însoțită de aură, întrebați: „Vedeți un punct luminos înainte de a avea dureri puternice de cap?”.
N Migrenă fără aură și vârstă < 35 ani, CDC și CIC = 2. Migrenă fără aură și vârstă ≥ 35 ani, CDC și CIC = 3.
O În caz de diabet zaharat cu complicații, sau diabet cu durată de peste 20 de ani, CDC, CIC, DMPA și NET-EN = 3-4.
P CDC = 3, CIC = 2.
Q Fenitoină, Carbamazepină, Barbiturice, Primidon, Topiramat, Oxcarbazepină.
R Dacă pacienta nu este într-o stare clinică bună, DIU = 3.
S În cazul în care cavitatea uterină este deformată, nu poate utiliza DIU.
T > 45 ani = 2.

Dezvoltat în colaborare cu:



© Organizația Mondială a Sănătății, 2006
© Institutul Est European de Sănătate a Reprodcerii, 2007

Mulțumiri

Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor și această versiune a Discului cu criteriile medicale de eligibilitate au fost elaborate de către Departamentul de Sănătate și Cercetare a Reprodcerii al Organizației Mondiale a Sănătății. Acest disc se bazează pe discuții similare cu criteriile medicale de eligibilitate, realizate independent în Ghana și Iordania. Dorim să mulțumim grupurilor implicate pentru munca lor inovatoare:

Ghana: Departamentul de Obstetrică și Ginecologie al Spitalului Clinic Korle Bu, componentă a Școlii Medicale a Universității din Ghana; și biroului teritorial al OMS în Ghana. Serviciul pentru Sănătate Ghana, UNFPA/Ghana, Societatea pe acțiuni cu răspundere limitată Câmpile de Aur, Ghana, JHPEGO, EngenderHealth, OMS/AFRO, USAID și OMS/Entreea au furnizat sprijin adițional tehnic sau financiar. **Iordania:** Parteneriatul pentru Comunicare în Sănătate al Iordaniei și Divizia din Orientul Apropiat, condusă de regretatul Dr. Alfred Yassa. În cadrul Parteneriatului pentru Comunicare în Sănătate de la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul pentru Programe de Comunicare, în colaborare cu Ministerul Sănătății din Iordania, și cu sprijinul USAID.

Dorim să mulțumim următoarelor persoane pentru munca deosebită în scopul combinării celor două discuri și finalizării acestui instrument: Dr. Charles Fleischer-Djoleto, OMS/Ghana; Dr. Enyonam Kwawukume, Spitalul Clinic Korle Bu; Dr. Ward Rinehart de la INFO Project, JHSPH/CCP; Dr. Therese Leske, OMS/AFRO; și Dr-ra Kathryn Church și Dr-ra Sarah Johnson, Departamentul de Sănătate și Cercetare a Reprodcerii, OMS.

Producerea acestui disc a fost făcută cu sprijinul Programului de Parteneriat Strategic UNFPA-OMS.

De asemenea, dorim să mulțumim: Dr. Kathryn Curtis, Dr. Catherine d'Arcangues, Dr. Nuriye Ortaylı și Dr. Paul Van Look pentru recenzia acestui instrument.

Prezentare și proiectare: Dr-ra Cath Hamill și Dr-ra Janet Pettipierre.

Comandarea copililor și informații suplimentare

În Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor, ediția a treia, 2004, sunt prezentate informații detaliate despre criteriile medicale de eligibilitate, inclusiv recomandări referitoare la alte metode contraceptive. Documentul poate fi accesat pe <http://www.who.int/reproductive-health> sau pot fi comandate copii la adresa de mai jos.

Copii ale versiunii în limba română pot fi obținute de la Fondul ONU pentru Populație, Bd. Primăverii Nr.48A, Sector 1, București, Tel: 021 201 7830. Fax: 021 201 7840, E-mail: office@unfpa.ro și de la Centrul de Documentare al Institutului Est European de Sănătate a Reprodcerii, Str. Moldovei 1, 540493, Târgu-Mureș, Telefon: 0265 255532, Fax: 0265 255370, E-mail: office@ceirh.org

Mulțumiri

Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor și această versiune a Discului cu criteriile medicale de eligibilitate au fost elaborate de către Departamentul de Sănătate și Cercetare a Reprodcerii al Organizației Mondiale a Sănătății. Acest disc se bazează pe discuții similare cu criteriile medicale de eligibilitate, realizate independent în Ghana și Iordania. Dorim să mulțumim grupurilor implicate pentru munca lor inovatoare:

Ghana: Departamentul de Obstetrică și Ginecologie al Spitalului Clinic Korle Bu, componentă a Școlii Medicale a Universității din Ghana; și biroului teritorial al OMS în Ghana. Serviciul pentru Sănătate Ghana, UNFPA/Ghana, Societatea pe acțiuni cu răspundere limitată Câmpile de Aur, Ghana, JHPEGO, EngenderHealth, OMS/AFRO, USAID și OMS/Entreea au furnizat sprijin adițional tehnic sau financiar. **Iordania:** Parteneriatul pentru Comunicare în Sănătate al Iordaniei și Divizia din Orientul Apropiat, condusă de regretatul Dr. Alfred Yassa. În cadrul Parteneriatului pentru Comunicare în Sănătate de la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul pentru Programe de Comunicare, în colaborare cu Ministerul Sănătății din Iordania, și cu sprijinul USAID.

Dorim să mulțumim următoarelor persoane pentru munca deosebită în scopul combinării celor două discuri și finalizării acestui instrument: Dr. Charles Fleischer-Djoleto, OMS/Ghana; Dr. Enyonam Kwawukume, Spitalul Clinic Korle Bu; Dr. Ward Rinehart de la INFO Project, JHSPH/CCP; Dr. Therese Leske, OMS/AFRO; și Dr-ra Kathryn Church și Dr-ra Sarah Johnson, Departamentul de Sănătate și Cercetare a Reprodcerii, OMS.

Producerea acestui disc a fost făcută cu sprijinul Programului de Parteneriat Strategic UNFPA-OMS.

De asemenea, dorim să mulțumim: Dr. Kathryn Curtis, Dr. Catherine d'Arcangues, Dr. Nuriye Ortaylı și Dr. Paul Van Look pentru recenzia acestui instrument.

Prezentare și proiectare: Dr-ra Cath Hamill și Dr-ra Janet Pettipierre.

Comandarea copilor și informații suplimentare

În Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor, ediția a treia, 2004, sunt prezentate informații detaliate despre criteriile medicale de eligibilitate, inclusiv recomandări referitoare la alte metode contraceptive. Documentul poate fi accesat pe <http://www.who.int/reproductive-health> sau pot fi comandate copii la adresa de mai jos.

Copii ale versiunii în limba română pot fi obținute de la Fondul ONU pentru Populație, Bd. Primăverii Nr.48A, Sector 1, București, Tel: 021 201 7830. Fax: 021 201 7840, E-mail: office@unfpa.ro și de la Centrul de Documentare al Institutului Est European de Sănătate a Reprodcerii, Str. Moldovei 1, 540493, Târgu-Mureș, Telefon: 0265 255532, Fax: 0265 255370, E-mail: office@ceirh.org