

INDEX

des principaux commentaires, tableaux, cartes et graphiques publiés au cours de l'année 1939.

(For English index, see following page.)

| | Pages | | Pages |
|---|---|--|-------------------------------|
| Cartes administratives : | | Dysenteries : | |
| AFRIQUE : | | EUROPE | 449 |
| Madagascar (cartes politique et physique) | 285 | Graphique: Evolution saisonnière, 1938/39, en Allemagne, Hongrie, Pologne et Roumanie; en Ukraine et Russie Blanche en 1936 | 449 |
| Tunisie | 61, 251 | Tableau: Cas et décès en Europe, par pays, 1933-1938 | 450 |
| AMÉRIQUE : | | Encéphalite léthargique | 542 |
| B Brésil | 273 | Graphiques: Cas en Angleterre, Finlande, Italie et Suède, 1919-1938 | 543 |
| Etats-Unis d'Amérique | 193 | Cas déclarés par mois dans divers pays du monde en 1920 et au Japon en 1924 | 545 |
| Mexique | 207 | Cas à Saint-Louis (1933) et au Japon (1924), juillet-octobre | 545 |
| ASIE : | | Répartition selon l'âge: morbidité et létalité | 545 |
| Afghanistan | 320 | Tableau: Cas ou décès déclarés en divers pays, 1934-1938; par trimestres en 1938/39 | 544 |
| Chine du sud-ouest, Birmanie et Tonkin | 422 | Grippe | 83, 167 |
| Inde | 145 | Graphiques: Décès dans les grandes villes anglaises au cours des épidémies de 1926 à 1939 | 122 |
| EUROPE : | | Décès pour 100.000 habitants dans les grandes villes anglaises et allemandes, 1921-1939 | 168 |
| Pologne | 71, 412 | Jaune (Fièvre) | 60, 361, 383 |
| Roumanie | 72 | Cartes: Répartition géographique de 1800 à 1937 | 375 |
| Yougoslavie | 73, 413 | Foyers en 1938 | 375 |
| Choléra : | | AFRIQUE : | |
| ASIE | 7, 144, 194, 372 | Cartes: Cas signalés de 1936 à 1938 | 53 |
| Cartogramme: Répartition géographique du choléra en Asie, 1930-1938 | 385 | Epreuves de protection | 53 |
| Cartes: Cas déclarés au cours des quatre dernières semaines | 1, 43, 87, 137, 185, 231, 275, 323, 365 | Tableaux: Cas et décès par localités, I, IV, 38-31, XII, 38 | 60 |
| Afghanistan | 45, 320, 372 | Cas signalés au cours des dix dernières semaines | 10, 96, 192, 286, 361 |
| Birmanie: Tableaux trimestriels | 95, 239, 394, 320 | AMÉRIQUE | 273 |
| Ceylan | 7, 422, 494 | Cartes: Cas déclarés et décès diagnostiqués, du 1 ^{er} janvier 1936 au 30 juin 1939 | 353 |
| Chine | 7, 422, 494 | Tableau: Décès par localités, du 1 ^{er} janvier 1938 au 30 avril 1939 | 273 |
| Cartogramme: Répartition géographique en 1938 | 8 | Méningite cérébro-spinale | 119, 183, 194, 330 |
| Graphique: Cas déclarés à Chang-Hai, de mai à octobre, 1926-1938 | 272 | Carte: Cas déclarés par pays 1936-1938 | 111 |
| Tableau: Cas dans les provinces de Kouang-Toung et de Kouang-Si, de juin à novembre 1938 | 9 | Tableaux: Cas déclarés par pays, 1934-1938; par trimestres en 1938 | 120 |
| Inde britannique | 9, 144, 194, 239, 373, 557 | Cas déclarés dans divers pays, par mois ou par périodes de 4 semaines, 1937/38 | 121, 330 |
| Cartes: Cas pour 100.000 habitants et par provinces, 1937 et 1938 | 145 | Mortalité générale | 309 |
| Graphiques: Décès hebdomadaires, 1931-1938 | 95 | Cartogramme: Taux pour 1.000 habitants, par pays, 1937/38; moyenne 1931-1935 | 301 |
| Décès hebdomadaires, 1932-1939 | 557 | Graphiques: Taux pour 1.000 habitants dans les grandes villes d'Allemagne, d'Angleterre et des Etats-Unis d'Amérique: 1935-1938 | 11 |
| Cas pour 100.000 habitants dans l'Inde et dans certaines provinces par périodes de 4 semaines, 1935-1939 | 145 | 1936-1939 | 75, 159 |
| Tableaux trimestriels | 95, 239, 394, 557 | Taux pour 1.000 habitants dans les grandes villes allemandes et anglaises, 1929-1939 | 169 |
| Inde française | 145 | Tableau: Taux pour 1.000 habitants, par pays, 1934-1938; moyenne, 1931-1935 | 308 |
| Iran | 320, 372, 379 | Mortalité infantile | 341 |
| Macao | 194 | Cartogramme: Taux pour 1.000 naissances dans les pays d'Europe, moyenne 1931-1935, et écart de cette moyenne en 1938 | 333 |
| Thaïlande (Siam) | 145, 194, 201 | Tableau: Taux pour 1.000 naissances, par pays, 1932-1938; moyenne 1931-1935 | 340 |
| Diphthérie | 132, 472, 558 | Poste | 429 |
| Cartogrammes: Mortalité diphtérique en Europe, 1936-1938 | 473, 559 | Cartogramme: Répartition géographique en 1938/39 | 431 |
| Mortalité diphtérique en Europe, 1924-1933 | 559 | AFRIQUE ORIENTALE, ASIE ET AUSTRALASIE : | |
| Graphiques: Mortalité en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Suède, 1885-1938 | 559 | Cartes: Cas déclarés au cours des quatre dernières semaines | 1, 43, 87, 137, 185, 231, 275 |
| Cas dans certains pays, 1928-1938 | 252 | AFRIQUE | 38 |
| Cas par mois ou par périodes de 4 semaines, 1936-1939; maximum, minimum et médian, 1924-1936, en Allemagne, Angleterre, France, Italie et Pologne | 125, 244 | Carte: Cas déclarés en 1937/38 | 31 |
| do. aux Etats-Unis d'Amérique maximum, minimum et médian, 1926-1936 | 125, 244 | Tableau: Cas et décès, par pays, 1936-1938 | 39 |
| Cas par mois ou par périodes de 4 semaines, 1938/39; maximum, minimum et médian, 1928-1938; en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Italie et en Pologne | 465, 549 | Tableau: Décès par mois, 1932-1939 (avec carte physique) | 285 |
| Tableaux: Cas déclarés, 1928-1938 | 133 | Ouganda | 39 |
| Taux de mortalité diphtérique dans certains pays d'Europe, 1921, 1928-1938 | 134, 472 | Tableau: Cas par provinces et districts en 1937/38, par périodes de 4 semaines en 1938 | 39 |
| Cas déclarés par pays en Europe et aux Etats-Unis, par mois ou par périodes de 4 semaines, 1937-1939 | 252, 473, 558, | Union Sud-Africaine | 283 |
| | | Cartes: Cas par districts ou localités, 1934-1939, et présence de la maladie 1930-1939 | 284 |
| | | Tableau: Cas, décès et nombre de districts infectés chaque année, par provinces, 1930-1939 | 284 |
| | | AMÉRIQUE DU NORD : | |
| | | Etats-Unis (Peste sylvatique) | 230 |
| | | Cartogrammes: Extension de la peste sylvatique: 1934-1938 | 240 |
| | | 1934-1939 | 429 |
| | | AMÉRIQUE DU SUD : | |
| | | Carte: Cas déclarés, 1937/38 | 107 |
| | | Tableau: Cas par pays et par provinces, 1936-1938 | 107 |
| | | Equateur | 101 |
| | | ASIE | 393 |
| | | Birmanie | 372 |
| | | Tableaux trimestriels | 94, 239, 393, 556 |
| | | Chine | 393 |
| | | Inde britannique | 50, 238, 393 |
| | | Tableaux trimestriels | 94, 239, 393, 556 |
| | | Indes néerlandaises: Java | 82, 393 |
| | | Tableau: Décès par régences et résidences, par périodes de quatre semaines, en 1938 | 82 |
| | | Thaïlande (Siam) | 7, 83 |
| | | Poliomyélite aiguë | 318, 362, 451, 494 |
| | | Graphiques: Cas déclarés par mois ou par périodes de 4 semaines, 1937-1939; maximum, minimum et médian, 1927-1937; en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suède et aux Etats-Unis | 311 |
| | | do. en Hongrie; maximum, minimum et médian, 1933-1937 | 311 |
| | | Cas déclarés par mois ou par périodes de 4 semaines, 1938/39; maximum, minimum et médian, 1928-1938; en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie et en Suède | 486 |
| | | do. en Hongrie; maximum, minimum et médian, 1934-1938 | 486 |
| | | Tableaux: Cas déclarés dans divers pays de l'hémisphère nord, 1932-1938; moyenne 1931-1935 | 319 |
| | | Cas déclarés par mois ou par périodes de 4 semaines, en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, 1937-1939 | 320, 362, 451 |
| | | Ports : | |
| | | Ports ou la présence éventuelle de cas de choléra, de peste ou de variole est signalée télégraphiquement au — et par — le Bureau d'Orient de l'Organisation d'hygiène à Singapour: | 197 |
| | | Carte | 171, 217, 495 |
| | | Tableau | 171, 217, 495 |
| | | Pourpree (Fièvre) : | |
| | | Tableau: Cas de fièvre pourpree des Montagnes Rocheuses déclarés aux Etats-Unis d'Amérique, par Etats, 1936-1938 | 206 |

| | Pages |
|--|----------------------------------|
| Quarantaine : | |
| Mesures en vigueur dans certains pays | 147 |
| Radiodiffusion : | |
| Stations radiotélégraphiques diffusant régulièrement les bulletins épidémiologiques de la Société des Nations : | |
| Carte | 197 |
| Tableau | 73, 146, 207, 298, 331, 395, 483 |
| Récurrentes (Fièvres) | 504 |
| Tableau: Cas et décès, par pays, 1931-1938; par trimestres de janvier à juin 1939 | 505 |
| Scarlatine | 28, 181, 462, 567 |
| Cartogrammes: Mortalité scarlatineuse en Europe, 1924-1933 et 1936-1938 | 568 |
| Graphiques: Cas déclarés et taux annuels de mortalité dans certains pays, 1928-1938 | 182 |
| Mortalité scarlatineuse en Allemagne, en Angleterre, en Suède et en Suisse, 1885-1938 | 568 |
| Cas déclarés en Allemagne, Angleterre et Pologne, 1922-1939 | 462 |
| Cas déclarés par mois ou par périodes de 4 semaines, 1937/38; maximum, minimum et médian, 1926-1936; en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Pologne et en Roumanie 21, 173, 453 | 453 |
| do. en Hongrie; maximum, minimum et médian, 1933-1937 | 21, 173, 453 |
| Cas déclarés par mois ou par périodes de 4 semaines, 1938/39; maximum, minimum et médian, 1928-1938; en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie et en Roumanie | 561 |
| do. en Hongrie; maximum, minimum et médian, 1934-1938 | 561 |
| Tableaux: Mortalité annuelle pour 100.000 habitants dans divers pays, 1928-1938 | 181 |
| Cas déclarés annuellement dans divers pays, 1928-1938 | 182 |
| Cas déclarés par mois ou par périodes de 4 semaines, en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, par pays, 1936-1939 | 29, 463, 568 |
| Typhoïdes (Fièvres) | 207, 443 |
| Graphiques: Cas par mois ou par périodes de 4 semaines, 1937-1939; maximum, minimum et médian, 1927-1937; en Allemagne, Angleterre, France, Pologne et Suède | 289, 433 |

| | Pages |
|---|-------------------|
| Fièvres typhoïdes (suite) : | |
| do. en Hongrie, maximum, minimum et médian, 1933-1937 289, 433 | 433 |
| Tableaux: Mortalité annuelle pour 100.000 habitants, par pays, en 1920 et de 1927 à 1937 | 444 |
| Cas déclarés par mois ou périodes de 4 semaines, en Europe, au Japon, aux Etats-Unis et en Australie, 1937-1939 | 297, 443 |
| Typhus exanthématique : | |
| AFRIQUE DU NORD ET PROCHE-ORIENT | 18 |
| Tableau: Cas déclarés, par pays, 1934-1938; par trimestres en 1938/39 | 18, 251 |
| AFRIQUE DU NORD 156, 205, 251, 309, 350, 395 | |
| Graphiques: Cas déclarés en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 1928-1938 | 19, 157 |
| Tunisie | 60, 108 |
| Tableau: Cas déclarés par districts et par périodes de 4 semaines: novembre-janvier, 1937/38 et 1938/39 | 61 |
| janvier-mai, 1938 et 1939 | 251 |
| janvier-août, 1939 | 395 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 205 |
| Cuba | 461, 536 |
| Etats-Unis: Tableau: Cas déclarés par Etats, 1936-1938; par trimestres en 1938/39 | 206 |
| Guatemala | 207 |
| Mexique: Tableau: Cas déclarés par Etats, 1938 | 207 |
| ASIE: | 19 |
| Turquie | 19 |
| EUROPE: | 411 |
| Graphique: Cas déclarés, par pays, 1920-1938 | 411 |
| Tableaux: Cas et décès, par pays, 1936-1939 | 70, 262, 411 |
| Europe orientale | 70, 169, 262, 410 |
| Cartogramme: Cas déclarés pour 100.000 habitants, par districts, en 1938 | 63, 403 |
| Espagne | 268 |
| Pologne | 71, 169, 262, 412 |
| Graphiques: Cas déclarés, par périodes de 4 semaines, 1935-1939 | 170, 412 |
| Tableaux: Cas et décès, par départements, 1935-1938; taux pour 100.000 habitants en 1938 | 71 |
| Cas et décès, par départements, 1937/38; par 4 semaines en 1939 | 262, 412 |

| | Pages |
|--|---------------------|
| Typhus exanthématique (suite) : | |
| Roumanie | 71, 263, 412 |
| Graphique: Cas déclarés par mois, 1935-1939 | 263, 413 |
| Tableaux: Cas déclarés par mois et par provinces en 1938; cas et décès par mois, 1936-1938; cas par départements 1936-1938 | 72 |
| Cas déclarés par mois, 1936-1938; par provinces, 1938/39 | 263, 412 |
| Yougoslavie | 72, 263, 413 |
| Tableaux: Cas et décès, par banovinats, 1935-1938; taux pour 100.000 habitants en 1938 | 73 |
| Cas par banovinats, 1936-1938; par trimestres en 1938/39; taux pour 100.000 habitants en 1938 | 413 |
| Variole : | |
| AFRIQUE ORIENTALE, ASIE ET AUSTRALASIE: | 1 |
| Cartes: Cas déclarés au cours des quatre dernières semaines 43, 87, 137, 185, 231, 275 | 1, 275 |
| AFRIQUE | 216 |
| Tableau: Cas et décès en 1937/38, par pays; par trimestres en 1938/39 | 216 |
| Tanganyka | 113 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 193 |
| Etats-Unis | 193 |
| Graphique: Cas déclarés dans certains groupes d'Etats, par périodes de 4 semaines, 1933-1939 | 193 |
| Tableau: Cas déclarés, par groupes d'Etats et par périodes de 4 semaines, 1937-1939 | 193 |
| Guatemala | 194 |
| Mexique | 194 |
| ASIE | 22 |
| Tableau: Cas et décès, par pays, 1935-1938; par trimestres, 1938/39 | 9 |
| Birmanie: voir Inde britannique. | 226 |
| Chine | 229 |
| Inde britannique et Birmanie | 51, 227 |
| Graphiques: Cas déclarés, par périodes de 4 semaines, 1934-1938 | 51, 227 |
| Tableaux trimestriels 108, 228, 394, 556 | 228 |
| Indochine française | 228 |
| Graphique: Cas déclarés, par provinces et par mois, 1934-1937 | 228 |
| EUROPE: | 268 |
| Espagne | 268 |

INDEX

to the Principal Notes, Tables, Maps and Graphs published in the Year 1939.

(Pour l'index en français, voir page précédente.)

| | Pages |
|---|-------------------------|
| Broadcasting : | |
| Wireless Stations which broadcast regularly the Epidemiological Bulletins of the League of Nations: | 197 |
| Map | 395, |
| Table 73, 146, 207, 298, 331, 483 | 483 |
| Cholera : | |
| ASIA | 7, 144, 194, 372 |
| Maps: Geographic distribution of cholera in Asia, 1930-1938 | 385 |
| Cases reported during the last four weeks 1, 43, 87, 137, 185, 231, 275, 323, 365 | 365 |
| Afghanistan | 45, 320, 372 |
| Burma: Quarterly tables 95, 239, 394, 557 | 394, 557 |
| Ceylon | 320 |
| China | 7, 422, 494 |
| Map: Geographic distribution in 1938 | 8 |
| Graph: Cases reported at Shanghai, May-October, 1926-1938 | 272 |
| Table: Cases in Kwangtung and Kwangsi Provinces, June-November, 1938 | 9 |
| India (British) | 144, 194, 239, 373, 557 |
| Maps: Cases per 100,000 population, by provinces, in 1937 and 1938 | 145 |

| | Pages |
|--|----------------------|
| Cholera (continued) : | |
| Graphs: Weekly number of deaths, 1931-1938 | 95 |
| Weekly number of deaths, 1932-1939 | 557 |
| Cases per 100,000 population, in India and certain provinces, by four-week periods, 1935-1939 | 145 |
| Tables: Quarterly tables 95, 239, 394, 557 | 394, 557 |
| India (French) | 145 |
| Iran | 320, 372, 379 |
| Macao | 194 |
| Thailand (Siam) | 145, 194, 201 |
| Diphtheria | 132, 472, 558 |
| Maps: Diphtheria mortality in Europe, 1936-1938 | 473, 559 |
| Diphtheria mortality in Europe, 1924-1933 | 559 |
| Graphs: Mortality in England, Germany, Hungary, the Netherlands and Sweden, 1885-1938 | 559 |
| Cases in certain countries, 1928-1938 | 252 |
| Cases by months or four-week periods, 1936-1939; maximum, minimum and median, 1924-1936, in England, France, Germany, Italy and Poland | 125, 244 |

| | Pages |
|---|------------|
| Diphtheria (continued) : | |
| do. in the United States of America; maximum, minimum and median, 1926-1936 | 125, 244 |
| Cases by months or four-week periods, 1938/39; maximum, minimum and median, 1928-1938; in England, France, Germany, Italy, Poland and the United States | 465, 549 |
| Tables: Cases reported, 1928-1938 | 133 |
| Diphtheria mortality rates in certain European countries, 1921, 1928-1938 | 134, 472 |
| Cases reported in the countries of Europe and in the United States, by months or four-week periods, 1937-1939 | 473, 558 |
| Dysentery : | |
| EUROPE | 449 |
| Graph: Seasonal trend, 1938/39, in Germany, Hungary, Poland and Roumania; in Ukraine and White Russia in 1936 | 449 |
| Table: Cases and deaths in Europe, by countries, 1933-1938 | 450 |
| Encephalitis lethargica | 542 |
| Graphs: Cases in England, Finland, Italy and Sweden, 1910-1938 | 543 |

| | Pages |
|---|---------------------------|
| Encephalitis lethargica (continued): | |
| Cases reported monthly in various countries of the world in 1920 and in Japan in 1924 | 545 |
| Cases at St. Louis (1933) and in Japan (1924), July-October | 545 |
| Age distribution: morbidity and case-fatality | 545 |
| Table: Cases or deaths reported in certain countries, 1934-1938; by quarters in 1938/39 | 544 |
| Influenza | 83, 167 |
| Graphs: Deaths in the great English towns during the epidemics from 1926 to 1939 | 122 |
| Deaths per 100,000 population in the great towns of England and Germany, 1921-1939 | 168 |
| Maps (Administrative): | |
| AFRICA: | |
| Madagascar (physical and political) | 285 |
| Tunisia | 61, 251 |
| AMERICA: | |
| Brazil | 273 |
| Mexico | 207 |
| United States of America | 193 |
| ASIA: | |
| Afghanistan | 320 |
| Burma, South-West China and Tongking | 422 |
| India | 145 |
| EUROPE: | |
| Poland | 71, 412 |
| Roumania | 72 |
| Yugoslavia | 73, 413 |
| Meningitis (Cerebro-spinal) | 119, 183, 194, 330 |
| Map: Cases reported, by countries, 1936-1938 | 111 |
| Tables: Cases reported, by countries, 1934-1938; by quarters in 1938 | 120 |
| Cases reported in various countries, by months or four-week periods, 1937/38 | 121, 330 |
| Mortality (General) | 309 |
| Map: Rates per 1,000 population, by countries, 1937/38; mean 1931-1935 | 301 |
| Graphs: Rates per 1,000 population in the great towns of England, Germany and the United States of America: | |
| 1935-1938 | 11 |
| 1936-1939 | 75, 159 |
| Rates per 1,000 population in the great English and German towns, 1929-1939 | 169 |
| Table: Rates per 1,000 population by countries, 1934-1938; mean 1931-1935 | 308 |
| Mortality (Infantile) | 341 |
| Map: Rates per 1,000 births in the countries of Europe, mean 1931-1935, deviation from the mean in 1938 | 333 |
| Table: Rates per 1,000 births, by countries, 1932-1938; mean 1931-1935 | 340 |
| Plague | 429 |
| Map: Geographic distribution in 1938/39 | 431 |
| EAST AFRICA, ASIA AND AUSTRAL-ASIA: | |
| Maps: Cases reported during the last four weeks 1, 43, 87, 137, 231, 275 | 185, 231, 275 |
| AFRICA | 38 |
| Map: Cases reported in 1937/38 | 31 |
| Table: Cases and deaths, by countries, 1936-1938 | 39 |
| Madagascar | 285 |
| Table: Deaths reported monthly, 1932-1939 (with physical map) | 285 |
| Uganda | 39 |
| Table: Cases by provinces and districts in 1937/38; by four-week periods in 1938 | 39 |
| Union of South Africa | 283 |
| Maps: Cases by districts or localities, 1934-1939; presence of the disease, 1930-1939 | 284 |
| Table: Cases, deaths and number of districts infected each year, by provinces, 1930-1939 | 284 |
| NORTH AMERICA: | |
| United States (Sylvatic plague) | 230 |
| Maps: Spread of sylvatic plague 1934-1938 | 240 |
| 1934-1939 | 429 |
| SOUTH AMERICA | 107 |
| Map: Cases reported, 1937/38 | 99 |
| Table: Cases, by countries and provinces, 1936-1938 | 107 |
| Ecuador | 101 |
| ASIA | 393 |
| Burma | 372 |
| Quarterly tables 94, 239, 393, 556 | 556 |
| China | 393 |
| India (British) | 50, 238, 393 |
| Quarterly tables 94, 239, 393, 556 | 556 |

| | Pages |
|--|---------------------------|
| Plague (continued): | |
| Netherlands Indies: Java | 82, 393 |
| Table: Deaths by regencies and residences, and by four-week periods, in 1938 | 82 |
| Thailand (Siam) | 7, 83 |
| Polio-myelitis (Acute) | 318, 362, 451, 494 |
| Graphs: Cases reported monthly or by four-week periods, 1937-1939; maximum, minimum and median, 1927-1937; in England, Germany, the Netherlands, Sweden and the United States | 311 |
| do. in Hungary; maximum, minimum and median, 1933-1937 | 311 |
| Cases reported monthly or by four-week periods, 1938/39; maximum, minimum and median, 1928-1938; in England, Germany, Italy, Sweden and the United States | 486 |
| do. in Hungary; maximum, minimum and median, 1934-1938 | 486 |
| Tables: Cases reported in various countries of the Northern Hemisphere, 1932-1938; mean 1931-1935 | 319 |
| Cases reported monthly or by four-week periods, in Europe and the United States of America, 1937-1939 | 320, 362, 451 |
| Ports: | |
| Ports where, in the event of cholera, plague or smallpox occurring, this information is reported by telegram to — and by — the Eastern Bureau of the Health Organisation at Singapore: | 197 |
| Map | 171, 217, 495 |
| Table | 171, 217, 495 |
| Quarantine: | |
| Restrictions in force in certain countries | 147 |
| Relapsing Fever | 504 |
| Table: Cases and deaths, by countries, 1931-1938; quarterly from January to June, 1939 | 505 |
| Scarlet Fever 28, 181, 462, 567 | |
| Maps: Scarlet-fever mortality in Europe, 1924-1933 and 1936-1938 | 568 |
| Graphs: Cases reported and annual mortality rates in certain countries, 1928-1938 | 182 |
| Scarlet-fever mortality in England, Germany, Sweden and Switzerland, 1885-1938 | 568 |
| Cases reported in England, Germany and Poland, 1922-1939 | 462 |
| Cases reported monthly or by four-week periods, 1937/38; maximum, minimum and median, 1926-1936; in England, Germany, Poland, Roumania and the United States 21, 173, 453 | 453 |
| do. in Hungary; maximum, minimum and median, 1933-1937 | 21, 173, 453 |
| Cases reported monthly or by four-week periods, 1938/39; maximum, minimum and median, 1928-1938; in England, Germany, Italy, Roumania and the United States | 561 |
| do. in Hungary, maximum, minimum and median, 1934-1938 | 561 |
| Tables: Annual mortality per 100,000 population in various countries, 1928-1938 | 181 |
| Cases reported yearly in certain countries, 1928-1938 | 182 |
| Cases reported monthly or by four-week periods, in Europe and the United States of America, by countries, 1936-1939 29, 463, 568 | 463, 568 |
| Smallpox: | |
| EAST AFRICA, ASIA AND AUSTRAL-ASIA: | |
| Maps: Cases reported during the last four weeks 1, 43, 87, 137, 185, 231, 275 | 216 |
| AFRICA | 216 |
| Table: Cases and deaths in 1937/38, by countries; quarterly in 1938/39 | 216 |
| Tanganyika Territory | 113 |
| NORTH AMERICA | 193 |
| Guatemala | 194 |
| Mexico | 194 |
| United States | 193 |
| Graph: Cases reported in certain groups of States, by four-week periods, 1933-1939 | 193 |
| Table: Cases reported, by groups of States and four-week periods, 1937-1939 | 193 |
| ASIA | 226 |
| Table: Cases and deaths, by countries, 1935-1938; quarterly, 1938/39 | 226 |
| Burma: see India (British) | 229 |
| China | 227 |
| India (British) and Burma | 51 |
| Graphs: Cases reported, by four-week periods, 1934-1938 | 51, 227 |
| Quarterly tables 108, 228, 394, 556 | 556 |

| | Pages |
|---|-------------------------------------|
| Smallpox (continued): | |
| Indo-China (French) | 228 |
| Graph: Cases reported, by provinces, monthly, 1934-1937 | 228 |
| EUROPE: | |
| Spain | 268 |
| Spotted Fever: | |
| Table: Cases of Rocky Mountain Spotted Fever reported in the United States of America, by States, 1936-1938 | 206 |
| Typhoid Fever | 297, 443 |
| Graphs: Cases reported monthly or by four-week periods, 1937-1939; maximum, minimum and median, 1927-1937; in England, France, Germany, Poland and Sweden | 289, 433 |
| do. in Hungary, maximum, minimum and median, 1933-1937 | 289, 433 |
| Tables: Annual mortality per 100,000 population, by countries, in 1920 and from 1927 to 1937 | 444 |
| Cases reported monthly or by four-week periods, in Europe, Japan, the United States and Australia, 1937-1939 | 297, 443 |
| Typhus Fever: | |
| NORTH AFRICA AND THE NEAR EAST | 18 |
| Table: Cases reported, by countries, 1934-1938; quarterly in 1938/39 | 18, 251 |
| NORTH AFRICA | 156, 205, 251, 309, 350, 395 |
| Graphs: Cases reported in Algeria, Morocco and Tunisia, 1928-1938 | 19, 157 |
| Tunisia | 60, 108 |
| Tables: Cases reported by districts and by four-week periods: | |
| November-January, 1937/38 and 1938/39 | 61 |
| January-May, 1938 and 1939 | 251 |
| January-August, 1939 | 395 |
| NORTH AMERICA | 205 |
| Cuba | 461, 536 |
| Guatemala | 207 |
| Mexico: Table: Cases reported by States, 1938 | 207 |
| United States: Table: Cases reported by States, 1936-1938; quarterly in 1938/39 | 206 |
| ASIA: | |
| Turkey | 19 |
| EUROPE: | |
| Graph: Cases reported, by countries, 1920-1938 | 411 |
| Tables: Cases and deaths, by countries, 1936-1939 | 70, 262, 411 |
| Eastern Europe | 70, 169, 262, 410 |
| Map: Cases reported, per 100,000 population, by districts in 1938 | 63, 403 |
| Poland | 71, 169, 262, 412 |
| Graphs: Cases reported, by four-week periods, 1935-1939 | 170, 412 |
| Tables: Cases and deaths, by departments, 1935-1938; rates per 100,000 population in 1938 | 71 |
| Cases and deaths, by departments, 1937/38; by four-week periods in 1939 | 262, 412 |
| Roumania | 71, 263, 412 |
| Graph: Cases reported monthly, 1935-1939 | 263, 413 |
| Tables: Cases reported monthly, by provinces, in 1938; cases and deaths monthly, 1936-1938; cases by departments, 1936-1938 | 72 |
| Cases reported monthly, 1936-1938; by provinces, 1938/39 | 263, 412 |
| Spain | 268 |
| Yugoslavia | 72, 263, 413 |
| Tables: Cases and deaths, by banovines, 1935-1938; rates per 100,000 population in 1938 | 73 |
| Cases by banovines, 1936-1938; quarterly in 1938-39; rates per 100,000 population in 1938 | 413 |
| Yellow Fever | 60, 361, 383 |
| Maps: Geographic distribution from 1800 to 1937 | 375 |
| Foci in 1938 | 375 |
| AFRICA: | |
| Maps: Cases notified from 1936 to 1938 | 53 |
| Sero-protection tests | 53 |
| Tables: Cases and deaths, by localities, I, IV, 38-31, XII, 38 | 60 |
| Cases notified during the last 10 weeks | 10, 96, 192, 286, 361 |
| AMERICA | 273 |
| Map: Cases reported and deaths diagnosed from January 1st, 1936, to June 30th, 1939 | 353 |
| Table: Deaths by localities, from January 1st, 1938, to April 30th, 1939 | 273 |